

RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO DI CONTRASTO Informativa e consenso

Cognome	Nome
Nato/a a	ili
Residente a	Via
Medico prescrittore	Medico curante
	ATTENZIONE ED EVENTUALMENTE RIVOLGERSI AL MEDICO E PER LA PIENA COMPRENSIONE DEI QUESITI RIPORTATI A PAG. 2
Esame richiesto (riportare quan	nto specificato nell'impegnativa)
ionizzanti o sostanze radioatt su pazienti privi di controino	Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni cive e, in base alle conoscenze attuali, non comporta effetti biologici rilevanti licazioni e viene svolto in accordo alle norme e agli standard di sicurezza. effettuare l'esame di Risonanza Magnetica nelle donne durante il nza.
A COSA SERVE: viene utiliz colonna vertebrale, dell'addor	zzata per la diagnosi di condizioni patologiche a carico dell'encefalo e della me, delle pelvi, dei grossi vasi e del sistema muscolo-scheletrico.
vengono posizionate all'estern anatomica da studiare. Dura dal normale funzionamento di contrasto paramagnetico p massimo grado di immob	ente viene sdraiato su un lettino e, in relazione al tipo di organo da studiare, no del corpo le cosiddette "bobine" sagomate in modo da adattarsi alla regione ante l'esame sono udibili dei rumori ritmici di intensità variabile provocati dell'apparecchio. Può essere necessaria la somministrazione di un mezzo per via endovenosa. Durante tutto l'esame è necessario mantenere il ilità, respirando regolarmente. Non è necessario interrompere eventuali so (ad es. per l'ipertensione o il diabete).
sensazione di claustrofobia, c	VENTUALI COMPLICANZE: raramente possono insorgere disturbi lievi come calore, prurito, affanno, palpitazioni o sensazione di malessere. In questi casi ceratori utilizzando un apposito dispositivo di segnalazione che avrà a portata e.
l'udito, auricolari, dentiera, occhiali, gioielli, orologi, carte chiavi, ganci, automatici, bo limette, forbici, altri eventual	E DI RM OCCORRE TOGLIERE: eventuali lenti a contatto, apparecchi per corone temporanee mobili, cinta erniaria, fermagli per capelli, mollette, e di credito o altre schede magnetiche, coltelli tascabili, ferma soldi, monete, ttoni metallici, spille, vestiti con lampo, pinzette metalliche, punti metallici, i oggetti metallici ed extension (capelli, ciglia). asportare cosmetici dal viso e piercing rimovibili.
Il Medico di Reparto è tenuto a forn	CASO DI PAZIENTE RICOVERATO/DH, PRE E POST RICOVERO ire tutte le informazioni relative alla corretta compilazione del questionario anamnestico
Unità Operativa	
Luogo, data	Firma del Medico di reparto

Dipartimento di Radiologia Clinica:

- Radiologia Treviso 0422 328290
- Neuroradiologia Treviso 0422 322512
- Radiologia Oderzo 0422 715322
- Radiologia Conegliano 0438 663219
- Radiologia Vittorio V.to 0438 665247
- Radiologia Castelfranco 0423 732490
- Radiologia Montebelluna 0423 611431

Strutture convenzionate

- Radiologia S. Camillo 0422 428262
- Radiologia Monastier 0422 896710 Radiologia ORAS 0422 287212 Motta di Livenza



QUESTIONARIO ANAMNESTICO per l'ESAME di RISONANZA MAGNI Il "questionario anamnestico" ha lo scopo di accertare l'assenza di controindicazioni all'esame. Deve attentamente e compreso in ogni sua parte. In caso di dubbi rivolgersi al proprio medico curante. La correttezza delle risposte fornite al Personale dell'Equipe RM in fase di somministrazione del quessenziale per il giudizio di idoneità alla esecuzione della indagine RM da parte del Medico Radiologo.	e essere letto uestionario è
1. Ha eseguito in precedenza esami di Risonanza Magnetica?	□sì□no
2. Soffre di claustrofobia?	□ SÌ □ NO
3. Ha mai lavorato (o lavora) come saldatore, tornitore, carrozziere?	□ sì □ NO
4. Ha mai subito incidenti stradali, incidenti di caccia?	□ SÌ □ NO
5. È stato vittima di traumi da esplosioni?	□ sì □ no
6. Ha mai avuto reazioni allergiche dopo mezzo di contrasto?	□ sì □ no
7. Ha subito interventi chirurgici:	□ sì □ no
Se SI, specificare la regione anatomica e il tipo di intervento:	
8. È a conoscenza di avere uno o più dispositivi medici o corpi metallici all'interno del corpo? 9. È portatore di (in caso di risposta positiva portare documentazione): - Pace Maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci?	□ sì □ NO
Se SÌ, contattare la Radiologia di competenza (Vedi numeri a pag. 1)	
- Schegge o frammenti metallici?	□ SÌ □ NO
- Clips su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello?	□ sì □ no
- Valvole cardiache?	□ sì □ no
- Stents?	□ sì □ no
- Defibrillatori impiantati?	□ sì □ no
- Distrattori della colonna vertebrale?	□ sì □ no
- Pompa di infusione per insulina o altri farmaci?	□ sì □ no
- Corpi metallici nelle orecchie o impianti per l'udito?	□ sì □ no
- Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali?	□ sì □ no □ sì □ no
Altri tipi di stimolatori?Dispositivo intrauterino (IUD) ?	□ Sì □ NO
- Dispositivo intratterino (100) : - Derivazione spinale o ventricolare?	
- Protesi dentarie fisse o mobili?	
- Protesi metalliche (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, etc), viti, chiodi, filo, etc?	
- Altre protesi (es. espansore mammario,)?	□ sì □ no
l ocalizzazione:	
10. Ritiene di poter avere protesi/apparecchi o altri corpi metallici all'interno del corpo	\
di cui potrebbe NON essere a conoscenza?	□ sì □ no
11. È portatore di protesi del cristallino?	□ sì □ no
12. Ha piercing non rimovibili? Localizzazione	□ sì □ no
13. Presenta tatuaggi? Localizzazione	□ SÌ □ NO
14. Sta utilizzando cerotti medicali?	□ SÌ □ NO
Il medico responsabile dell'esame RM, preso atto delle risposte fornite nel questionario anamnestico	
□ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA L'ESECUZIONE DELL'INDAGINE RM	
Luogo, data Firma del Medico responsabile dell'esecuzione dell'e	same RM
g-,	
CONSENSO del paziente all'esecuzione dell'indagine RM con mdc	
II/La Sottoscritto/a	
in qualità di: \Box paziente \Box genitore \Box tutore \Box amministratore di sostegno (AdS)	
ritiene di essere stato sufficientemente informato sui rischi e sulle controindicazioni legate all'esposizione e elettromagnetici generati dalla apparecchiatura RM nonché sulle potenziali reazioni avverse al mdc. Pertar consapevole dell'importanza delle risposte fornite:	
□ ACCONSENTE □ NON ACCONSENTE ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME	
Dichiaro di □ NON essere □ essere in stato di gravidanza certa o presunta (solo se applicabile)	

M_RADIO_RM_MDC_rev_02_2023

Luogo, data

Firma Paziente/genitore/tutore/AdS



QUESTIONARIO di VALUTAZIONE del Le informazioni acquisite da questo questionar valutazione del rischio ai Mezzi di Contrasto. In cas	io sono fondamentali ai fini di una corretta
Creatinina (da prelievo eseguito negli ultimi 3 mesi)	
Filtrazione Glomerulare) (dato disponibile nel referto de	
In caso di eGFR<35 contattare quanto prima il reparto	
1. Ha mai presentato reazione avversa alla son	nministrazione del Mezzo di Contrasto che abbia
comportato l'interruzione dell'esame e/o somr	ninistrazione di farmaci? □ SÌ □ NO
- molecola responsabile della reazione avversa	
•	in Radiologia di competenza (Vedi numeri a pag. 1)
Il radiologo valuterà la possibilità di una metod	
In caso di esame non sostituibile e la molecola	responsabile della reazione avversa è conosciuta,
il giorno dell'esame verrà utilizzata una mole	cola differente.
Se la molecola responsabile non è nota,	sarà necessario effettuare una visita allergologica
(con impegnativa del Medico curante), avente reattiva per l'esame.	come esito l'indicazione della molecola meno
In ogni caso, il paziente dovrà effettuare ui	na premedicazione (Preparazione 1 a pag. 4).
2. È affetto/a da una delle seguenti patologie?	
- mastocitosi sistemica o cutanea (prurito e	pomfi, arrossamenti cutanei) □ SÌ □ NO
- anafilassi idiopatica (orticaria, difficoltà res	•
legati all'anafilassi di cui non è riconoscibile	
Se ha risposto Sì, anche ad uno solo dei qu	
effettuare una premedicazione (Preparazione	
Altre allergie (molluschi, crostacei, pesci o alt	ri alimenti, ad altre categorie di farmaci,
ipersensibilità a betadine o iodoformio) non s	ono da considerare un fattore di rischio
per la somministrazione del Mezzo di Contra	sto.
3. È affetto/a da asma bronchiale, orticaria rico	_
terapia? Nello specifico, nelle ultime 4 settin	
- ha avuto episodi asmatici più di 2 volte/set	
- ogni notte si sveglia per l'asma?	
- ha usato il salbutamolo (Ventolin/Broncoval	
 ha avuto limitazioni delle attività quotidiane ha avuto episodi di orticaria o angioedema 	
il trattamento con antistaminici?	□SÌ□NO
Se ha risposto Sì, anche ad uno solo dei q	uesiti del punto 3, è necessario rivolgersi
al proprio medico curante per un aggiustamer	to della terapia, contattare la Radiologia
di competenza per sospendere l'esame e, a pa	ziente stabilizzato, telefonare in Radiologia di
competenza per la riprogrammazione dello s	
Prima dell'esame sarà necessaria una premed	Cazione (Preparazione 2 a pag. 4).
In tutti i casi in cui via sia urgenza a faro rapida gestita in Radiologia (Preparazione 3 a p	e l'esame verrà effettuata una premedicazione ag. 4).
Luogo, data	Firma paziente/genitore/tutore/AdS



PREPARAZIONE all'ESAME con MEZZO di CONTRASTO

NON MANGIARE 4 ORE PRECEDENTI L'ESAME. NON BERE 1 ORA PRECEDENTE L'ESAME.

Presentarsi 30 minuti prima dell'orario fissato per l'esame.

PREPARAZIONI da eseguire a domicilio PRIMA dell'ESAME con MEZZO di CONTRASTO IODATI E **PARAMAGNETICI:**

- 1. Preparazione 1: RIVOLGERSI AL PROPRIO MEDICO CURANTE
- premedicazione per via orale: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg), 12 e 2 ore prima dell'esame +antistaminico (es. cetirizina) 1 ora prima dell'esame, oppure
- premedicazione per via intramuscolare: con metilprednisolone 40 mg, 12 e 2 ore prima dell'esame +clorfenamina 10 mg, 1 ora prima dell'esame, cui aggiungere montelukast 10 mg.
- 2. Preparazione 2: RIVOLGERSI AL PROPRIO MEDICO CURANTE
- premedicazione per via orale: prednisone 50 mg (o metilprednisolone 32 mg), 13, 7 e 1 ora prima dell'esame +antistaminico (es. cetirizina), 1 ora prima dell'esame, oppure
- premedicazione per via intramuscolare: con metilprednisolone 40 mg, 13, 7 e 1 ora prima dell'esame +clorfenamina 10 mg, 1 ora prima dell'esame.
- 3. Preparazione 3 (preparazione eseguita e gestita presso la Struttura Sanitaria):
- premedicazione rapida per via endovenosa con bolo di idrocortisone 200 mg + clorfenamina 10 mg subito prima dell'esame, monitorare i parametri vitali durante la procedura e allertare l'anestesista/rianimatore.

CONSENSO per l'USO DI SOLUZIONI/GEL, PREPARATI FARMACEUTICI O EVENTUALE INTRODUZIONE dI BOBINE ENDOGENE IN RISONANZA MAGNETICA

A seconda dell'esame richiesto di Risonanza Magnetica è possibile sia necessaria ai fini diagnostici la somministrazione di:

- soluzioni/gel per via rettale o vaginale (es. nelle defeco-RM, studio pavimento pelvico, studio di patologia della cavità uterina e/o vaginale)
- prodotti farmaceutici per via endovenosa ipotonizzanti (es. Buscopan) o diuretici (es. Lasix)
- ansiolitici per impedire attacchi di panico o stati d'ansia gravi che inficerebbero l'indagine
- in alcuni casi è prevista l'introduzione nel corpo di bobine endogene

Per ogni informazione specifica si rimanda alla scheda tecnica specifica. Ogni eventuale ulteriore chiarimento può essere richiesto al medico radiologo.

Il paziente si ritiene sufficientemente informato/a sui rischi legati alla:

- somministrazione di soluzioni/gel o preparati farmaceutici per via orale o rettale
- somministrazione di preparati farmaceutici per via endovenosa o intramuscolare o intrarticolare

• introduzione di b	obine endogene	
□ ACCONSENTE	□ NON ACCONS	SENTE
Luogo, data		Firma paziente/genitore/tutore/AdS
CON	ISENSO alla SOMM	INISTRAZIONE di SEDATIVI per ANESTESIA
Il paziente si ritiene suff	icientemente informato	INISTRAZIONE di SEDATIVI per ANESTESIA sui rischi legati alla somministrazione di sedativi per l'anestesia. Pertanto, le dell'esame diagnostico della valutazione dei rischi correlati/beneficio
Il paziente si ritiene suff messo/a a conoscenza	icientemente informato	sui rischi legati alla somministrazione di sedativi per l'anestesia. Pertanto, le dell'esame diagnostico della valutazione dei rischi correlati/beneficio